

ESTRATEGIA DE REVISIÓN DE INMUNIZACIÓN FRENTE AL SARAMPIÓN EN PROFESIONALES DEL SERVICIO DE URGENCIAS

GEMA LASA, ESTHER GALLARDO, COVADONGA A.BERROCAL

PALABRAS CLAVE : PROFESIONALES,SARAMPIÓN,INMUNIZACIÓN,SALUD PÚBLICA,URGENCIAS.

INTRODUCCIÓN

Debido al aumento de casos y brotes de sarampión identificados en 2023 y 2024 se hace necesario poner en práctica las recomendaciones del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola en España 2021-2025. Se ha observado una mayor transmisión en el ámbito sanitario, con un riesgo 13 veces mayor de contraer la enfermedad que en la población general, además de su papel amplificador en la transmisión de la enfermedad. Teniendo los profesionales del servicio de urgencias una mayor exposición de riesgo previo al diagnóstico inicial.

METODOLOGÍA

Catalogación de los profesionales del servicio de urgencias en función de:

- Cohorte de nacimiento.
- Antecedente documentado de vacunación correcta frente a sarampión.
- Antecedente documentado de evidencia de inmunidad frente al sarampión.

Elaboración de algoritmo de toma de decisiones.

Programación e Intervención según algoritmo.

OBJETIVOS

- Identificar y captar a los profesionales no inmunizados frente al sarampión del servicio de urgencias.
- Asegurar la correcta inmunización frente al sarampión de los profesionales del servicio de urgencias.

RESULTADOS

- Profesionales que presentan antecedente documentado de evidencia de inmunidad y/o vacunación correcta frente al sarampión. Se realiza registro en su historia clínica laboral, lo que facilitará una rápida intervención en caso de contacto estrecho.

- Profesionales con antecedente vacunal y/o serológico desconocido. Actuación y registro según algoritmo.

- Profesionales con serología negativa documentada frente al sarampión. Actuación y registro según algoritmo.

CONCLUSIÓN

En el ámbito sanitario los profesionales deberían documentar la vacunación con dos dosis de vacuna frente al sarampión separadas entre sí por lo menos cuatro semanas y/o evidencia de inmunidad. Aquellos profesionales que no lo acrediten deberán ser vacunados para una protección efectiva.

La utilización exclusiva de vacunación sistemática no es suficiente para mantener la situación de eliminación del sarampión. Es necesario poner en marcha medidas adicionales de captación y vacunación de la población sometida a mayor riesgo entre la que se encuentran los profesionales del ámbito sanitario.

ALGORITMO DE TOMA DE DECISIONES

